

## ANNEX

مؤشرات صحة حديثي الولادة لأنظمة البيانات الروتينية  
في أنظمة إعداد التقارير الوطنية. تم اقتراح مؤشرات أخرى لتوفير معلومات إضافية ، حيثما أمكن ذلك (\* دمج المؤشرات الرئيسية (غامقة باللون الأحمر) ومشار إليها بعلامة

مؤشر	البسط	المقام	التفصيل	فائدة وقيود المؤشرات
<b>النتائج</b>				
<a href="#">معدل وفيات حديثي الولادة *</a>	عدد المواليد الذين ماتوا خلال أول 28 يومًا (اليوم 0-27) من الحياة في المرافق الصحية في فترة زمنية محددة	إجمالي عدد المواليد الأحياء (لكل 1000) في فترة زمنية محددة	حسب توقيت الوفاة (وفاة حديثي الولادة المبكرة = 0 إلى 6 أيام ؛ وفاة حديثي الولادة المتأخرة = 7 إلى 27 يومًا)	يجب أن تشير التقارير إلى ما إذا كانت الوفيات التي تحدث في المجتمع يتم تسجيلها في منشأة.
<a href="#">معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة قبل التخرج</a>	عدد الأطفال الذين يولدون يعيشون في منشأة ويتوفون قبل الخروج من المرفق خلال أول 28 يومًا (اليوم 0-27) من الحياة في فترة زمنية محددة	عدد الأطفال المولودين يعيشون في منشأة في فترة زمنية محددة	حسب وقت الوفاة (وفاة حديثي الولادة المبكرة = 0 إلى 6 أيام ؛ وفاة حديثي الولادة المتأخرة وفاة حديثي الولادة المتأخرة)	
<a href="#">سبب وفاة حديثي الولادة</a>	عدد وفيات الأطفال حديثي الولادة بسبب <ul style="list-style-type: none"> <li>● قلة الوزن عند الولادة والخداج</li> <li>● مضاعفات أحداث الولادة</li> <li>● حالات العدوى (بما في ذلك التيتانوس ، وتعفن الدم / التهاب السحايا ، (والالتهاب الرئوي).</li> <li>● التشوهات الخلقية أو الشذوذ</li> <li>● آخر</li> <li>● غير محدد</li> </ul>	عدد وفيات حديثي الولادة المسجلة في مرفق	حسب توقيت الوفاة (وفاة حديثي الولادة المبكرة = 0 إلى 6 أيام ؛ وفاة حديثي الولادة المتأخرة = 7 إلى 27 يومًا)	لا يُقصد بالمؤشر تفسيره على أنه معدل إماتة للحالات ، ولكنه يوفر معلومات عن سبب الوفاة بين الوفيات المعروفة والمبلغ عنها.  يجب أن تشير التقارير إلى ما إذا كانت أسباب الوفيات التي تحدث في المجتمع مسجلة في المنشأة.
<a href="#">معدل المواليد الموتي في المنشأة الصحية *</a>	عدد الأجنة والرضع المولودين بدون أي علامة للحياة والمولودين بوزن عند الولادة يبلغ 1000 جم أو أكثر ، أو بعد 28 أسبوعًا من الحمل ، أو 35 أو أكثر بطول الجسم في فترة زمنية محددة	إجمالي عدد المواليد (لكل 1000) في منشأة في فترة زمنية محددة	حسب توقيت / نوع موت الجنين أو الإملاص (قبل الولادة أو أثناء الولادة) ، حيثما أمكن ذلك	يجب أن تشير التقارير إلى ما إذا كان يتم تسجيل حالات الإملاص التي تحدث في المجتمع في المنشأة.

## ANNEX

النسبة المئوية للمواليد الأحياء في منشأة يعاني فيها المولود من صعوبة في التنفس عند الولادة (أو لم يكن يتنفس عند الولادة)	عدد المواليد الأحياء في منشأة يعاني فيها المولود من صعوبة في التنفس عند الولادة (أو لم يكن يتنفس عند الولادة)	عدد المواليد الأحياء في المنشأة	يعمل بسط هذا المؤشر كمقام لـ "النسبة المئوية للأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من صعوبة في التنفس عند الولادة (أو لم يتنفسوا عند الولادة) (حيث تم استخدام تقنيات الإنعاش" (انظر أدناه).  فسر هذا المؤشر بحذر شديد. إذا تم تصنيف الأطفال الذين لا يتنفسون في كثير من الأحيان على أنهم إملاص ، فإن تقديم برنامج للإنعاش والتدريب قد يؤدي إلى زيادة واضحة في عدد الأطفال الذين لا يتنفسون عند الولادة. في الوقت نفسه ، يمكن أن تشير الأعداد الكبيرة من الأطفال حديثي الولادة الذين لا يتنفسون إلى رداءة جودة الرعاية أثناء الولادة
--	---	---------------------------------	--

يشير موت الجنين قبل الولادة (الإملاص - المتعطن) إلى موت الجنين داخل الرحم بعد الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل وقبل المخاض. يشير موت الجنين أثناء الولادة (ولادة جنين ميت - حديث الولادة) إلى وفاة الطفل بعد بدء المخاض وقبل الولادة. ولا تظهر<sup>1</sup> حالات الإملاص الطازجة أي علامات على النقع.

## ANNEX

<p><a href="#">(نسبة الأطفال المولودين بوزن منخفض عند الولادة (أقل من 2500 جرام</a></p>	<p>عدد المواليد الأحياء الذين يقل وزنهم عن 2500 جم عند الولادة</p>	<p>إجمالي عدد المواليد الأحياء في المنشأة</p>	<p>مهم بشكل خاص عندما يكون قياس عمر الحمل غير موثوق به</p> <p>في حين يجب أخذ وزن ولادة محدد وتسجيله لكل طفل على حدة ، إذا كان الإبلاغ ضعيفاً ، يمكن استخدام فئة واحدة تلتقط الأطفال الذين يقل وزنهم عن 2500 جرام مع استجابة نعم / لا في السجلات بدلاً من ذلك</p>
<p><a href="#">النسبة المئوية للمواليد في منشأة ما قبل الأوان *</a></p>	<p>عدد المواليد الجدد الذين تقل أعمارهم عن 37 أسبوعاً</p>	<p>إجمالي عدد المواليد الأحياء في المنشأة</p>	<p>قسّم حسب عمر الحمل بالأسابيع والأيام ، حيثما أمكن ذلك:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• معتدل إلى متأخر (32 إلى &gt;37 أسبوعاً)</li> <li>• الخدج جداً (من 28 إلى أقل من 32 أسبوعاً)</li> <li>• الخدج للغاية (أقل من 28 أسبوعاً)</li> </ul> <p>إذا تم تسجيل عمر الحمل للولادات خارج المنشأة في المرفق ، فيمكن تغيير المقام إلى إجمالي عدد <a href="#">(انظر مؤشر معدل الولادة المبكرة)) المواليد الأحياء ((على أساس السكان</a></p> <p>غالبًا ما يتم الحصول على عمر الحمل عن طريق سؤال المرأة الحامل عن تاريخ آخر دورة شهرية بدلاً من القياس السريري ، وبالتالي يخضع لقضايا الموثوقية.</p>

مؤشر	البسط	المقام	فائدة وقيود المؤشرات
<b>الاستفادة من الخدمة والتغطية وجودة الرعاية</b>			
<p>(رعاية ما قبل الولادة (زيارة واحدة على الأقل</p>	<p>عدد النساء اللواتي تمت رعايتهن على يد عاملين صحيين مهرة مرة واحدة على الأقل خلال فترة الحمل التي أدت إلى ولادتهن الأخيرة</p>	<p>إجمالي عدد النساء اللواتي ولدن أحياء</p>	<p>يمكن استخدام البسط لهذه المؤشرات لحساب "النسبة المئوية للعملاء قبل الولادة الذين قاموا بزيارة رابعة للرعاية قبل الولادة" (البسط: عدد العملاء قبل الولادة مع الزيارة الرابعة للرعاية قبل الولادة ؛ المقام: العدد الإجمالي للعملاء قبل الولادة مع الزيارة الأولى</p>
<p><a href="#">(رعاية ما قبل الولادة (أربع زيارات على الأقل</a></p>	<p>عدد النساء اللواتي تلقين رعاية ما قبل الولادة أربع مرات أو أكثر من أي مزود أثناء الحمل التي أدت إلى ولادتهن الأخيرة</p>	<p>إجمالي عدد النساء اللواتي ولدن أحياء</p>	
<p><a href="#">العميلة السابقة للولادة الزيارة الأولى قبل 12 أسبوعاً من الحمل</a></p>	<p>عدد العملاء في فترة ما قبل الولادة أول زيارة قبل 12 أسبوعاً</p>	<p>إجمالي عدد المراجعين في فترة ما قبل الولادة مع الزيارة الأولى</p>	<p>علامة للنساء اللواتي اتصلن بمقدم الخدمة في وقت مبكر بما يكفي أثناء الحمل للسماح بتقديم خدمات الحمل الأساسية والتعرف المبكر على المشكلات التي يمكن معالجتها لتحسين النتائج للنساء والأطفال حديثي الولادة.</p>
<p><a href="#">معدل الولادة القيصرية *</a></p>	<p>عدد الولادات القيصرية في فترة زمنية محددة</p>	<p>إجمالي عدد النساء اللواتي ولدن في منشأة في فترة زمنية محددة</p>	<p>علامة على رعاية التوليد الشاملة في حالات الطوارئ. يمكن أن تعني الأعداد الكبيرة استخدام العمليات القيصرية غير المشار إليها. يمكن تصنيفها حسب المناطق الحضرية / الريفية و / أو القطاع الخاص مقابل القطاع العام لتحديد أوجه عدم المساواة وكذلك الاستخدام غير الملائم.</p>
<p><a href="#">إنعاش حديثي الولادة بالحقيبة والقناع</a></p>	<p>عدد الأطفال حديثي الولادة الذين لم يتنفسوا بشكل عفوي أو يبكون عند الولادة ، وبالتالي تطلبوا الإنعاش (التحفيز و / أو الكيس والقناع) الذي يتعين القيام به</p>	<p>إجمالي عدد المواليد الأحياء في المنشأة</p>	<p>على الرغم من أهمية مراقبة تنفيذ برامج الإنعاش ، إلا أن هذا المؤشر يحتاج إلى توخي الحذر الشديد. انظر الملاحظات أعلاه لمؤشر النسبة المئوية للولادات الحية في منشأة يعاني فيها المولود من صعوبة (في التنفس عند الولادة (أو لم يكن يتنفس عند الولادة</p>
<p><a href="#">الشروع المبكر في الرضاعة الطبيعية</a></p>	<p>عدد الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية خلال ساعة واحدة (1) من الولادة في منشأة صحية</p>	<p>عدد المواليد الأحياء في المنشأة الصحية</p>	<p>وتجدر الإشارة إلى أن البدء المبكر بمؤشر الرضاعة الطبيعية هو جزء من رعاية الأطفال حديثي الولادة الأساسية ، ولكن لا يمكن استخدامه كبديل بمفرده لرعاية الأطفال حديثي الولادة الأساسية</p>

## ANNEX

<u>حديثو الولادة يتلقون الرعاية الأساسية لحديثي الولادة</u>	عدد الأطفال حديثي الولادة الذين تلقوا جميع العناصر الأربعة (4) للرعاية الأساسية لحديثي الولادة (التجفيف الفوري والشامل ؛ ملامسة الجلد للجلد (الفوري ؛ لقط الحبل المتأخر ؛ وبدء الرضاعة الطبيعية في الساعة الأولى	عدد المواليد الأحياء في المنشأة الصحية	
---	--	--	--

## ANNEX

<a href="#">(CHX) تطهير الحبل بالكورهيكسيدات</a>	عدد الأطفال حديثي الولادة الذين تلقوا جرعة واحدة (1) على الأقل من الكلورهيكسيدات ديجلوكونات (7.1٪) إلى الحبل السري خلال 24 ساعة من الولادة	إجمالي عدد المواليد الأحياء	للعناية النظيفة بالحبل ، مثل الوقاية من العدوى. في بعض البلدان ، حيث CHX مقياس لاستخدام يتم استخدام المطهرات الأخرى وفقاً للإرشادات القياسية أو كممارسة سريرية روتينية ، يمكن تعديل المؤشر لالتقاط المطهر المستخدم.
<a href="#">حديثي الولادة - (PNC) تغطية رعاية ما بعد الولادة</a>	مع مقدم رعاية صحية خلال يومين من PNC عدد الأطفال حديثي الولادة الذين تلقوا الولادة	إجمالي عدد المواليد الأحياء	يمكن تعديل توقيت زيارات المجلس الوطني الفلسطيني المتوقعة وفقاً للتعريف الخاص بكل دولة من قبل وزارة الصحة
<a href="#">(KMC) الأطفال حديثي الولادة على رعاية الأم كانغارو</a>	في منشأة (أو تم قبولهم في وحدة KMC عدد المواليد الجدد الذين تم بدئهم في (في حالة وجود وحدة منفصلة KMC	إجمالي عدد المواليد الأحياء في المنشأة	لفترة زمنية كافية. يصعب تحديد KMC أو ما إذا كان المولود قد تلقى KMC لا تقيس جودة خدمات العدد الإجمالي للأطفال الخدج أو الأطفال المؤهلين ، لذلك يستخدم هذا المؤشر نسبة عدد مرات إلى عدد المواليد الأحياء. يجب استخدام المعلومات الأخرى (أسباب وفاة الأطفال KMC قبول حديثي الولادة ، إلخ) جنباً إلى جنب مع هذا المؤشر لتقدير ما إذا كانت معظم الولادات المبكرة / في المرافق KMC تتلقى LBW الولادات
<a href="#">حديثو الولادة يعالجون من إنتان / عدوى حديثي الولادة</a>	عدد الأطفال حديثي الولادة الذين يتلقون العلاج (حقنة واحدة على الأقل من المضادات الحيوية) للاشتباه في وجود عدوى بكتيرية خطيرة في المرفق	إجمالي عدد المواليد الأحياء في المنشأة	يجب أن يكملوا العلاج (بناءً على PSBI قياس جودة الرعاية لأن الأطفال حديثي الولادة المصابين بـ الدلائل الإرشادية الوطنية) لزيادة فرصة البقاء على قيد الحياة. لا يشمل حالات الأطفال حديثي الولادة الذين يبدوون العلاج في الأوساط المجتمعية ؛ يمكن تكيفها مع سياسة العلاج الوطنية إذا تم تضمين بدء علاج الإنتان على مستوى المجتمع. أفضل استخدام على المستوى المحلي لمراقبة جودة الرعاية وتحسينها.
مؤشرات لتتبع تدخلات الرعاية السابقة للولادة			
<a href="#">النسبة المئوية للنساء الحوامل اللواتي يحضرن الرعاية قبل الولادة اللائي تلقين +2 ذوفان الكزاز</a>	عدد النساء اللواتي يتلقين جرعتين على الأقل من ذوفان الكزاز	إجمالي عدد النساء اللواتي ولدن أحياء	غير كافٍ - يقيس هذا المؤشر ما إذا كانت المكونات المهمة قد تم تسليمها ، ANC تتبع عدد زيارات وكثير منها يمكن أن يمنع وفيات الأطفال حديثي الولادة يفضل استخدام السجلات الطولية لتتبع هذه المؤشرات
<a href="#">اللائي تلقين فحص مرض ANC النسبة المئوية للنساء الحوامل اللواتي يحضرن الزهري</a>	عدد المرضى قبل الولادة الذين تم فحصهم للكشف عن مرض الزهري في فترة زمنية محددة.	العدد الإجمالي للعملاء قبل الولادة الذين قاموا بزيارة أولى في فترة زمنية محددة.	غير كافٍ - يقيس هذا المؤشر ما إذا كانت المكونات المهمة قد تم تسليمها ، ANC تتبع عدد زيارات وكثير منها يمكن أن يمنع وفيات الأطفال حديثي الولادة يفضل استخدام السجلات الطولية لتتبع هذه المؤشرات
<a href="#">يتم تقديم المشورة للنساء الحوامل واختبارهن لفيروس نقص المناعة البشرية</a>	عدد النساء اللائي تلقين النصح وعرضن الاختبار الطوعي لفيروس نقص المناعة البشرية في مركز رعاية الطفل قبل ولادتهن الأخيرة وحصلن على نتائج الاختبار	إجمالي عدد النساء اللواتي ولدن أحياء	غير كافٍ - يقيس هذا المؤشر ما إذا كانت المكونات المهمة قد تم تسليمها ، ANC تتبع عدد زيارات وكثير منها يمكن أن يمنع وفيات الأطفال حديثي الولادة يفضل استخدام السجلات الطولية لتتبع هذه المؤشرات

## ANNEX

قائمة المؤشرات والأسئلة لقياس قدرة المنشأة على تقديم الخدمات الصحية الرئيسية لحديثي الولادة  
2012. مقتبس من مجموعة عمل مؤشرات حديثي الولادة ، تقييم المرافق الصحية السريعة لخدمات حديثي الولادة ، يونيو

مؤشر	البسط	المقام	التفصيل	فائدة وقيود المؤشرات
<b>مدى توفر الخدمة</b>				
قابلات ماهرات 24/7	عدد المرافق التي بها خدمات الأمومة للمرضى الداخليين مع مقدم رعاية ماهر في إجراء الولادات الموجودة في المرفق أو تحت الطلب في جميع الأوقات (24 ساعة في اليوم ، 7 أيام في الأسبوع) والجدول الزمني الملاحظ	إجمالي عدد المرافق المزودة بخدمات الأمومة للمرضى الداخليين التي تم تقييمها	نوع المرفق (على سبيل المثال ، مستشفى (مقابل مركز صحي	
<a href="#">توافر مرافق التوليد ورعاية الأطفال حديثي</a> <a href="#">لكل ( EmONC ) الولادة في حالات الطوارئ</a> <a href="#">(مجموعة من السكان</a>	في الأشهر الثلاثة EmONC عدد مرافق رعاية التوليد التي وفرت وظائف إشارة الماضية: (BEmONC): رعاية التوليد وحديثي الولادة في حالات الطوارئ الأساسية - إعطاء المضادات الحيوية عن طريق الحقن لعلاج الإنتان - - إعطاء الأدوية المقوية لتوتر الرحم (على سبيل المثال ، الأوكسيتوسين بالحقن أو - جداول الميزوبروستول) لعلاج نزيف ما بعد الولادة وحمض الترانكساميك في الوريد بالإضافة إلى الرعاية القياسية للنساء المصابات بنزيف ما بعد الولادة المشخص سريريًا - الإعطاء عن طريق الحقن لمضادات الاختلاج (أي كبريتات المغنيسيوم) للتحكم في مقدمات الارتعاج الشديدة وتسمم الحمل (الولادة المهبلية المساعدة (على سبيل المثال ، الاستخراج بالشفط - الإزالة اليدوية للمشيمة - إزالة نواتج الحمل المحتجزة بعد الولادة أو الإجهاض الناقص - (إنعاش حديثي الولادة (على سبيل المثال ، بالحقيبة والقناع - (CEmONC): رعاية التوليد وحديثي الولادة الشاملة في حالات الطوارئ  السبعة BEmONC جميع وظائف إشارة- (جراحة التوليد (أي الولادة القيصرية - نقل الدم الآمن مع مراعاة الاحتياطات العامة للوقاية من العدوى -	(500.000 مجموع السكان (لكل	نوع المرفق  نوع الخدمة (BEmONC / CEmONC)  عبء الحالات على المنشأة (على سبيل المثال ، المرافق التي تقل عن 10 ولادات (10 شهرًا مقابل المرافق التي تحتوي على	تحدد إرشادات الأمم المتحدة بشأن مراقبة رعاية التوليد في حالات الطوارئ ما لا يقل عن خمسة مرافق رعاية التوليد في (CEmONC حالات الطوارئ) بما في ذلك واحد على الأقل يوفر لكل 500000 نسمة. في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة ، أو المواقع ذات القيود الرئيسية على الوصول ، قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من المرافق لضمان توفر الخدمات لتلبية احتياجات السكان
<a href="#">توفر خدمة رعاية الأم من كانجارو</a> <a href="#">(KMC)</a>	وحيث تلقى الموظفون تدريب KMC عدد المرافق التي تم فيها تحديد مساحة ل (أقل من سنتين) KMC	إجمالي عدد المرافق المزودة بخدمات الأمومة للمرضى الداخليين التي تم تقييمها	نوع المرفق	

مؤشر	البسط	المقام	فائدة وقيود المؤشرات
<b>جاهزية الخدمة</b>			
النسبة المئوية للمرافق المزودة بخدمات * الأمومة للمرضى الداخليين بدون نفاذ المخزون خلال الأشهر الثلاثة الماضية من كبريتات الماغنيسيوم	عدد المرافق التي تقدمت الأمومة للمرضى الداخليين دون نفاذ المخزون في الأشهر الثلاثة الماضية من : ● كبريتات الماغنيسيوم	إجمالي عدد المرافق المزودة بخدمات الأمومة للمرضى الداخليين التي تم تقييمها	يوفر معلومات حول ما إذا كانت السلع متوفرة ، ولكن ليس إذا تم استخدامها على النحو المنشود أو إذا كانت السلع تعمل / غير منتهية الصلاحية.

## ANNEX

<p>النسبة المئوية للمرافق المزودة بخدمات * الأمومة للمرضى الداخليين بدون نفاذ المخزون خلال الأشهر الثلاثة الماضية من: ● حقيبة وقناع (حجم حديثي الولادة)</p>	<p>عدد المرافق التي تقدمت الأمومة للمرضى الداخليين دون نفاذ المخزون في الأشهر الثلاثة الماضية من: ● (1 حقيبة وقناع (مقاس 0 و</p>	<p>إجمالي عدد المرافق المزودة بخدمات الأمومة للمرضى الداخليين التي تم تقييمها</p>	<p>يتم تعريف المخزون على أنه الغياب التام لسلعة أو توريد عند نقطة التسليم ليوم واحد على الأقل خلال فترة التقرير. يجب استخراج البيانات من نظام معلومات إدارة اللوجستيات الوطني إذا كان النظام يوفر تفاصيل حول توفر الإمدادات الصيدلانية على مستوى المنشأة الصحية.</p>
<p>النسبة المئوية للمرافق المزودة بخدمات * الأمومة للمرضى الداخليين بدون نفاذ المخزون في الأشهر الثلاثة الماضية من: ● ديكساميثازون ● (كورتيكوستيرويد)</p>	<p>عدد المرافق التي تقدم خدمات الأمومة للمرضى الداخليين دون نفاذ المخزون في الأشهر الثلاثة الماضية من: ● (ديكساميثازون (كورتيكوستيرويد</p> <p>فقط في المرافق التي يمكن فيها استيفاء الشروط التالية ACS من المتوقع أن يتم توفير:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● يمكن إجراء تقييم عمر الحمل بدقة</li> <li>● يمكن أن يتلقى المولود الخديج رعاية كافية إذا لزم الأمر (بما في ذلك الإنعاش والرعاية (الحرارية ودعم التغذية وعلاج العدوى والاستخدام الآمن للأوكسجين</li> <li>● يمكن إجراء تقييم عمر الحمل بدقة</li> </ul>	<p>إجمالي عدد المرافق المزودة بخدمات الأمومة للمرضى الداخليين التي تم تقييمها</p>	<p>قد تختلف السلع الأساسية حسب البلد ؛ تكييف المؤشرات بناءً على قوائم الأدوية / السلع الأساسية الوطنية.</p>
<p>النسبة المئوية للمرافق المزودة بخدمات * مع عدم وجود مخزون في الأشهر ANC الثلاثة الماضية من: ● الحديد / الفولات ● (IPTP- سلفادوكسين بيريميثامين SP (إذا كانت السياسة SP لقاح الكزاز</p>	<p>مع عدم وجود مخزون في الأشهر الثلاثة الماضية من ANC عدد المرافق مع خدمات: ● الحديد / الفولات ● IPTp-SP ● لقاح الكزاز</p>	<p>التي تم تقييمها ANC إجمالي عدد المرافق التي تحتوي على خدمات</p>	
<p>النسبة المئوية للمرافق التي تقدم خدمات * رعاية حديثي الولادة دون نفاذ المخزون في الأشهر الثلاثة الماضية من: ● الجنتاميسين عن طريق الحقن ● حقن بنزبل بنسلين أو أمبيسلين ● أموكسيسيلين عن طريق الفم</p>	<p>عدد المرافق التي تقدم خدمات رعاية حديثي الولادة دون نفاذ المخزون في الأشهر الثلاثة الماضية من: ● الجنتاميسين عن طريق الحقن ● X-Penicillin عن طريق الحقن ● أموكسيسيلين عن طريق الفم</p>	<p>إجمالي عدد المرافق المزودة بخدمات الأمومة للمرضى الداخليين التي تم تقييمها</p>	
<p>مقوي توتر الرحم عن طريق الحقن للوقاية / إدارة النزف التالي للوضع</p>	<p>عدد المرافق المزودة بخدمات الأمومة للمرضى الداخليين ومُقَوِّي توتر الرحم عن طريق الحقن ((تمت ملاحظته وجرعة واحدة على الأقل صالحة</p>	<p>إجمالي عدد المرافق المزودة بخدمات الأمومة للمرضى الداخليين التي تم تقييمها</p>	<p>نوع المنشأة</p>

ANNEX

مؤشر	البسط	المقام	التفصيل
<b>معدات ولوازم</b>			
حقيبة وقناع لحديثي الولادة	عدد المرافق المزودة بخدمات الأمومة للمرضى الداخليين مع حقيبة الخدج وحديثي الولادة (مقاس (و 1) والقناع المتاح ويعمل في منطقة الولادة) (تمت ملاحظته	إجمالي عدد المرافق المزودة بخدمات الأمومة للمرضى الداخليين التي تم تقييمها	نوع المنشأة
طاولة الإنعاش	عدد المرافق التي بها خدمات الأمومة للمرضى الداخليين مع طاولة إنعاش مع مصدر حرارة متاح (وتعمل في منطقة الولادة) (تمت ملاحظتها	إجمالي عدد المرافق المزودة بخدمات الأمومة للمرضى الداخليين التي تم تقييمها	
مقياس الرضع	عدد المرافق التي تحتوي على خدمات الأمومة للمرضى الداخليين مع توافر مقياس للرضع وتعمل في (منطقة الولادة) (تمت ملاحظته	إجمالي عدد المرافق المزودة بخدمات الأمومة للمرضى الداخليين التي تم تقييمها	
صابون أو مطهر لليدين	عدد المرافق المزودة بخدمات الأمومة للمرضى الداخليين بالصابون أو باليد	إجمالي عدد المرافق المزودة بخدمات الأمومة للمرضى الداخليين التي تم تقييمها	
منشفة للتجفيف	عدد المرافق التي بها خدمات الأمومة للمرضى الداخليين مع مناشف لتجفيف الأطفال في منطقة (الولادة) (تمت ملاحظته	إجمالي عدد المرافق المزودة بخدمات الأمومة للمرضى الداخليين التي تم تقييمها	
البروتوكولات أو المبادئ التوجيهية	عدد المرافق التي بها خدمات الأمومة للمرضى الداخليين مع مناشف لتجفيف الأطفال في منطقة الولادة (تمت ملاحظته <ul style="list-style-type: none"> <li>التدبير المتكامل للحمل والولادة (جميع المرافق)</li> <li>(إحالة المرضى حديثي الولادة) (جميع المرافق)</li> <li>رعاية التوليد الشاملة في حالات الطوارئ (مرافق مع خدمات الأمومة للمرضى الداخليين)</li> <li>إدارة المخاض قبل الأوان (مرافق مع خدمات الأمومة للمرضى الداخليين)</li> </ul>	إجمالي عدد المرافق المزودة بخدمات الأمومة للمرضى الداخليين التي تم تقييمها	
<b>توثيق</b>			
سجل تسليم محدث	عدد المرافق المزودة بخدمات الأمومة للمرضى الداخليين مع سجل ولادة حديث (نتيجة الولادة للرضيع (ووزن الولادة المسجل لآخر 10 ولادات) (تمت ملاحظته	إجمالي عدد المرافق المزودة بخدمات الأمومة للمرضى الداخليين التي تم تقييمها	نوع المنشأة
مراقبة رعاية ما بعد الولادة	عدد المرافق التي لديها توثيق للرصد 2 لرعاية ما بعد الولادة لحديثي الولادة	إجمالي عدد المرافق التي تم تقييمها	نوع المنشأة
<b>تمرين</b>			



## ANNEX

مقدمي الخدمة المدربين	<p>عدد مقدمي خدمات الولادة / حديثي الولادة الذين تمت مقابلتهم والذين تم تدريبهم خلال الاثني عشر شهرًا الماضية في كل مجال من المجالات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إنعاش حديثي الولادة باستخدام الحقيبة والقناع</li> <li>• (الرضاعة الطبيعية) (المبكرة) والحصرية</li> <li>• (إدارة عدوى حديثي الولادة) (بما في ذلك المضادات الحيوية عن طريق الحقن</li> <li>• (العناية الحرارية) (بما في ذلك التجفيف الفوري والعناية بالبشرة</li> <li>• قطع الحبل المعقم والعناية المناسبة بالسلك</li> <li>• للأطفال منخفضي الوزن عند الولادة KMC</li> <li>• ممارسات رعاية التوليد الخاصة للوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل</li> <li>• استخدام الكورتيكوستيرويدات في المخاض المبكر</li> </ul>	إجمالي عدد مقدمي خدمات الولادة / حديثي الولادة الذين تمت مقابلتهم	نوع المنشأة
مرافق مع مقدمي خدمات مدربين	<p>عدد المرافق التي تضم ما لا يقل عن نصف مقدمي الخدمة الذين تمت مقابلتهم 3 تم تدريبهم خلال الاثني عشر شهرًا الماضية في كل من المجالات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إنعاش حديثي الولادة باستخدام الحقيبة والقناع</li> <li>• (الرضاعة الطبيعية) (المبكرة) والحصرية</li> <li>• إدارة عدوى حديثي الولادة (بما في ذلك المضادات (الحيوية عن طريق الحقن</li> <li>• (العناية الحرارية) (بما في ذلك التجفيف الفوري والعناية بالبشرة</li> <li>• (قطع الحبل المعقم والعناية المناسبة بالسلك</li> <li>• للأطفال الخدج و / أو منخفضي الوزن عند الولادة KMC</li> <li>• ممارسات رعاية التوليد الخاصة للوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل</li> <li>• استخدام الكورتيكوستيرويدات في المخاض المبكر</li> </ul>	إجمالي عدد المرافق مع مقدمي خدمات الولادة / حديثي الولادة الذين تمت مقابلتهم	نوع المنشأة
<b>إشراف</b>			
مرافق مع الإشراف الروتيني	عدد المرافق ذات الإشراف الروتيني (أفاد نصف مقدمي الخدمة الذين تمت مقابلتهم على الأقل أنهم (خضعوا للإشراف الشخصي مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الستة السابقة للمسح	إجمالي عدد المرافق مع مقدمي خدمات الولادة / حديثي الولادة الذين تمت مقابلتهم	نوع المنشأة
<b>مراقبة الوفيات والاستجابة لها</b>			
<a href="#">مراجعة (مراجعة) وفيات الأطفال حديثي الولادة</a>	عدد المرافق المزودة بخدمات الأمومة للمرضى الداخليين التي تقوم بمراجعة أو مراجعة وفيات الأطفال حديثي الولادة لفهم أسباب / ظروف الوفاة وتحديد الإجراءات اللازمة للتخفيف من الحوادث المستقبلية	إجمالي عدد المرافق التي تمت زيارتها مع خدمات الأمومة للمرضى الداخليين	نوع المنشأة
<a href="#">مراجعة (مراجعة) الإملاص في المرافق قيد التنفيذ</a>	عدد المرافق المزودة بخدمات الأمومة للمرضى الداخليين التي تقوم بمراجعة أو مراجعة حالات الإملاص أثناء الولادة لفهم الأسباب / الظروف وتحديد الإجراءات للتخفيف من الحوادث المستقبلية	إجمالي عدد المرافق التي تمت زيارتها مع خدمات الأمومة للمرضى الداخليين	نوع المنشأة
<a href="#">تمت مراجعة النسبة المئوية لوفيات الفترة المحيطة بالولادة</a>	عدد حالات الإملاص ووفيات الأطفال حديثي الولادة (في الفترة المحيطة بالولادة) التي تم تدقيقها	إجمالي عدد حالات الإملاص ووفيات الولدان في المرفق	نوع المنشأة